

BRODIMAX FORTE girasole

ESCA RODENTICIDA PER USO DOMESTICO E CIVILE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Brodifacoum	0,005 g
Denatonium Benzoato	0,001 g
Inerti, adescanti e pigmenti	q. b. a 100 g

NORME PRECAUZIONALI: Non ingerire - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare il recipiente ben chiuso – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non contaminare durante l'uso alimenti bevande o recipienti destinati a contenerne – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – Mascherare le esche nei posti frequentati da persone o da animali domestici – Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riportarle in luogo sicuro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e delle mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica.

Terapia: in caso di ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare vitamina K.

Controindicazioni: anticoagulanti.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

BRODIMAX FORTE è efficace e pratico nella lotta contro topi e ratti presenti nelle abitazioni, depositi, giardini, solai o altri luoghi infestati.

BRODIMAX FORTE contiene una sostanza (Denatonium Benzoate) che lo rende immangiabile ai bambini e agli animali domestici.

MODO D'IMPIEGO

BRODIMAX FORTE va distribuito in mucchietti nei luoghi di maggiore presenza, con particolare attenzione agli angoli riparati, sotto scaffali, e dietro mobili e arredi, avendo cura di evitare il contatto con persone ed animali. L'azione di **BRODIMAX FORTE** si svolge finché presente, pertanto è opportuno rinnovare l'esca man mano che viene consumata. L'esca deve essere utilizzata all'interno di un contenitore con accesso previsto solo per l'animale bersaglio. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali non bersaglio e devono essere fissate in modo che possano essere trascinate via con altri roditori.

Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. I roditori morti devono essere eliminati in modo idoneo. Terminata la disinfestazione se devono distruggere le esche residue o eliminarle in un luogo idoneo.

DA NON USARE IN AGRICOLTURA

TITOLARE A.I.C.

MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.r.l.

Via Brigata Marche 129 - 31030 CARBONERA (TV)

Tel. +39 – 0422 445455 Fax +39 – 0422 398244

www.mayerbraun.com

e-mail : question@mayerbraun.com

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Registrazione del Ministero della Salute N° 18733

Officina di produzione: Mayer Braun Deutschland S.r.l. Carbonera (TV)

CONTENUTO:

Validità: 2 anni nella confezione originale

Lotto N° del

DA NON VENDERSI SFUSO

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO